

D KOŽA I POTKOŽNO TKIVO**D01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU****D01A Antimikotici za lokalnu primjenu****D01AA Antibiotici****D01AA01 nistatin**

Doziranje: 1-3 puta na dan premazati oboljelo mjesto u tankom sloju.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NISTATIN Pliva mast - PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Rp mast [100.000 i.j./g] 20 g masti

NYSTATIN - HEMOFARM A.D. Vršac

Rp mast [100 000 i.j./g] 20 g masti

D01AC Derivati imidazola i triazola**D01AC01 klotrimazol**

Doziranje: *Krem ili rastvor* nanose se u tankom sloju i utrljavaju na oboljela mjesta 2 puta na dan, ujutro i uveče. Nakon nestanka kliničkih znakova treba nastaviti primjenu lijeka još najmanje 2 nedjelje.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CANESTEN - BAYER SCHERING PHARMA AG

BRp krem [10 mg/g] 20 g krema

BRp prašak za kožu [10 mg/g] 30 g praška za kožu

BRp rastvor za kožu [10 mg/ml] 20 ml rastvora za kožu

KANSEN - ZDRAVLJE A.D.

BRp krem [10 mg/g] 20 g krema

PLIMYCOL - PLIVA HRVATSKA d.o.o.

BRp krem [10 mg/g] 20 g krema

D01AC02 mikonazol

Doziranje: Krem se primjenjuje utrljavanjem na oboljelo mjesto 2 puta na dan, ujutro i uveče, najčešće 2 nedjelje. **Poslije nestanka simptoma treba nastaviti liječenje još nekoliko dana.**

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DAKTANOL - GALENIKA a.d.

BRp krem [20 mg/g] 30 g krema

DAKTARIN - KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Rp krema [20 mg/g] 30 g kreme

ROJAZOL krema - BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Rp krema [20 mg/g] 30 g kreme

D01AC08 ketokonazol

Doziranje: *Krem* se namaže na oboljelo mjesto i dva santimetra uokolo, jednom dnevno. Liječenje traje u prosjeku 2-3 nedjelje, max. do 6 nedjelja. *Šampon* se nanosi na oštećeni dio kože i vlasišta i nakon 3-5 minuta ispere se vodom. Kod pitirijaze versikolor primjenjuje se jednom dnevno tokom 5 dana, a u liječenju seboroičnog dermatitisa i peruti, dva puta nedjeljno, tokom 2-4 nedjelje.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AQUARIUS - DEMO S.A.

BRp šampon [20 mg/ml] 60 ml šampona

MYCOSEB - HEMOFARM A.D. Vršac

BRp šampon [20 mg/g] 100 ml (plastična boca)

REKONAZOL - REPLEK FARM DOOEL Skoplje

Rp krem [20 mg/g] 30 g

BRp šampon [20 mg/ml] 120 ml

D01AC20 izokonazol nitrat, diflukortolon valerat

Doziranje: Dva puta dnevno nanijeti na oboljeli dio kože. Primjenu prekinuti nakon smirivanja upalnih i ekcematoznih promjena na koži, ili nakon dvije sedmice neprekidne primjene. Tretman nastaviti preparatima koji ne sadrže kortikosteroide.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TRAVOCORT - BAYER SCHERING PHARMA AG

Rp krema [(10 mg + 1mg)/g] 15 g kreme

D01AE Ostali antimikotici za lokalnu primjenu

D01AE14 ciklopiroks

Doziranje: OBYTIN se utrljava na oboljela mjesta i na neposrednu okolinu - 2 puta na dan (ujutro i uveče). Poboljšanje kliničke slike se javlja poslije nedjelju dana, a liječenje traje u prosjeku 3-4 nedjelje. Ako ni poslije 4 nedjelje primjene lijeka nema poboljšanja, liječenje treba prekinuti.

Kod pitirijaze (Pytriasis versicolor) izlječenje se postiže poslije dvije nedjelje.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OBYTIN - JUGOREMEDIJIA fabrika lekova a.d. Zrenjanin

Rp krem [10 mg/g] 20 g kreme

Rp prašak za kožu [10 mg/g] 30 g praška za kožu

Rp rastvor za kožu [10 mg/ml] 20 ml rastvora za kožu

D01AE15 terbinafin

Doziranje: Tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis: 1 nedjelja, jedanput dnevno; Kožna kandidijaza: 1 - 2 nedjelje, jednom do dva puta dnevno; Pytiriasis versicolor: 2 nedjelje, jednom do dva puta dnevno. Povlačenje kliničkih simptoma obično nastupa unutar nekoliko dana. Neredovita upotreba ili prerano prekidanje liječenja nose sa sobom rizik recidiva. Ukoliko nakon dvije sedmice nema znakova poboljšanja, pacijent se treba posavjetovati sa svojim ljekarom.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ATIFAN - KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Rp krema [10 mg/g] 15 g kreme

LAMISIL 1% - NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA

Rp krem [10 mg/g] 15 g kreme

LAMISIL DermGel 1% - NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA

Rp gel [10 mg/g] 15 g gela

LAMISIL once 1% - NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA

Rp otopina za kožu [10 mg/g] 4 g

MYCOCUR - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

Rp krema [10 mg/g] 15 g kreme

D01B Antimikotici za sistemsku primjenu**D01BA Antimikotici za sistemsku primjenu****D01BA02 terbinafin**

Doziranje: Odrasli: 250 mg jednom dnevno. Trajanje liječenja je različito u zavisnosti od indikacije i ozbiljnosti infekcije. Deca: ispod 20 kg: ½ od 125 mg 1 put na dan; deca 20-40 kg: 125 mg 1 put na dan; deca iznad 40 kg 250 mg (2 tablete od 125 mg).

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ATIFAN - KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Rp tablete [125 mg] 14 tableta

Rp tablete [250 mg] 14 tableta

LAMISIL - NOVARTIS PHARMA AG

Rp tablete [125 mg] 14 tableta

Rp tablete [250 mg] 14 tableta

VERBINAF - PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Rp tablete [125 mg] 14 tableta

Rp tablete [250 mg] 14 tableta

Rp tablete [250 mg] 28 tableta

MYCOCUR - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

Rp tablete [250 mg] 14 tableta

Rp tablete [250 mg] 28 tableta

D03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE RANA I ULCERACIJA**D03A Lijekovi za terapiju ožiljaka****D03AX Ostali lijekovi za terapiju ožiljaka****D03AX deproteiniziran hemodijalizat teleće krvi**

Doziranje: Mast ili gel nanijeti u tankom sloju na ranu, dva puta dnevno. Mast je pogodna u tretmanu suhih lezija, a u formi gela u tretmanu lezija koje vlaže. Gel se koristi u početnom tretmanu svih vrsta ulceracija i teških opekotina. Mast se primjenjuje kada se pojave svježe granulacije na cijeloj površini ulkusa, a primjena se nastavlja do potpune epitelizacije. Lakši oblici trofičkih promjena se mogu liječiti i samo lokalno, dok je za liječenje teških trofičkih oštećenja kože i mekih tkiva neophodno kombinovano, parenteralno i lokalno liječenje. Liječenje traje u prosjeku 4 - 8 sedmica. U slučaju gnojnih ulceracija preporučuje se primjena vlažnih zavoja (otopina borne kiseline, Dakinova otopina) prije započinjanja liječenja *Solcoseryl*-om, a po potrebi i antimikrobik.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SOLCOSERYL - ALKALOID AD

Rp gel [4,15 mg/g] 20 g gela

Rp mast [2,07 mg/g] 20 g masti

D03AX03 dekspantenol

Doziranje: *Krem i mast* se nanose na oštećenu i oboljelu kožu 2-3 puta dnevno u tankom sloju i blago utrljaju. Tretirano područje treba prethodno očistiti. *Rastvor* se primjenjuje nerazblažen ili razblažen destilovanom vodom u odnosu 1:1 i nanosi 2-3 puta na dan na oboljelo mjesto na koži, koje prethodno treba očistiti.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PANTHENOL - HEMOFARM A.D. Vršac

BRp mast [50 mg/g] 30 g masti

**D04 *ANTIPRURITICI (SREDSTVA PROTIV SVRABA),
UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL.***

D04A Antipruritici, uključujući antihistaminike, anestetike i sl.

D04AA Antihistaminici za lokalnu primjenu

D04AA09 hloropiramin

Doziranje: Nanijeti u tankom sloju na oboljeli dio kože i blago utrljati 2-3puta na dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SYNOPEN mast - PLIVA HRVATSKA d.o.o.

BRp mast [10 mg/g] 20 g masti

D04AA13 dimetinden

Doziranje: Gel se može nanijeti na kožu 2-4 puta na dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FENISTIL gel - NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA

BRp gel [1 mg/g] 30 g gela

D04AX *Ostali antipruritici (lijekovi protiv svraba)*

D04AX krotamiton

Doziranje: *Antipruritično djelovanje:* Lijek se namaže dva do tri puta na dan i lagano utrlja u dijelove tijela koji svrbe. *Akaricidno djelovanje:* Jednom dnevno nakon kupanja namaže se cijelo tijelo. Postupak se ponavlja 3 do 5 dana, ovisno o djelovanju. Nakon završetka liječenja potrebno je ponovo okupati tijelo te promijeniti rublje i posteljinu. Malu djecu mažemo jedanput na dan. Ako su zahvaćene veće površine kože, naizmjenice mažemo ruke i tijelo. *Pedikulocidno djelovanje:* Lijek se nanosi na kosu i tjeme te ostavi djelovati 24 sata. Kosa se opere i počešlja da se odstrane gnjide. Nakon 8 dana pažljivo se pregleda tjeme i kosa. Postupak se po potrebi ponovi.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

EURAX - NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA

BRp emulzija za kožu [100 mg/g] 50 ml emulzije za kožu

BRp krem [100 mg/g] 20 g krema

**D05 *ANTIPSORIJATICI (LIJEKOVI ZA LIJEČENJE
PSORIJAZE)***

D05A Antipsorijatici za lokalnu primjenu

D05AX *Ostali antipsorijatici za lokalnu primjenu*

D05AX02 kalcipotriol

Doziranje: Kalcipotriol mast nježno utrljati na psorijatične promjene na koži, jednom do dva puta dnevno. Maksimalna dozvoljena doza iznosi 100 g masti sedmično. Kalcipotriol otopina za vanjsku primjenu: Nježno utrljati samo na psorijatične promjene na skalpu, dva puta dnevno. Namazana otopina se mora ostaviti dovoljno dugo da se osuši na sobnoj temperaturi. Maksimalna dozvoljena doza iznosi 60 ml otopine za vanjsku primjenu sedmično. Ukoliko se mast i otopina primjenjuju istovremeno pacijent ne smije uzeti više od navedenih količina sedmično i to: 60 ml otopine za vanjsku primjenu i 30 g masti ili 30 ml otopine za vanjsku primjenu i 60 g masti. U toku perioda održavanja postignutih terapijskih efekata preparat se može primjenjivati rljeđe, samo jednom

dnavno. Inače, kalciptriol se može primjenjivati u različitom trajanju, odnosno onoliko dugo koliko se uspijevaju održati zadovoljavajući klinički efekti. Po prekidu primjene kalciptriola može nastati pogoršanje i ponovna pojava psorijatičnih lezija

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SOREL - LEK farmacevtska družba d.d.

Rp otopina [50 mcg/ml] 60 ml

Rp mast [50 mcg/g] 30 g

D05AX05 tazaroten

Doziranje: Na čistu i suhu kožu nanosi se mala količina gela jedanput na dan, najbolje naveče, isključivo na oboljela područja. Nakon kupanja je potrebno dobro osušiti kožu prije nanošenja gela. U početku liječenja potrebne su kontrole ljekara jedanput sedmično. Liječenje obično traje 12 sedmica.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ZORAC - BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Rp gel [0,50 mg/g] 15 g

Rp gel [1 mg/g] 15 g

D06 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU

D06A Antibiotici za lokalnu primjenu

D06AX Ostali antibiotici za lokalnu primjenu

D06AX neomicin, bacitracin

Doziranje:

- sprej za kožu prije upotrebe treba dobro protresti i jedanput ili više puta na dan poprskati oboljelo mjesto sa udaljenosti 20-25 cm.
- mast: se na oboljelo mjesto nanosi 2-4 puta na dan.
- praškom se jedanput ili više puta na dan pospe oboljelo mjesto.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BIVACYN - LEK farmacevtska družba d.d.

Rp mast [3500 i.e. + 500 i.e.] 30 g masti

Rp prašak u raspršivaču [165000 i.e. + 12500 i.e.] 150 ml

ENBECIN - GALENIKA a.d.

Rp sprej za kožu, prašak [(825 i.j. + 62,5 i.j.)/g] 200 g

Rp mast za kožu i oči [(3.300 i.j. + 500 i.j.)/g] 5 g masti za kožu i oči

D06AX01 fusidinska kiselina

Doziranje: Mast se nanosi na oboljelo mjesto 2-3 puta dnevno u tankom sloju.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

STANICID - HEMOFARM A.D. Vršac

Rp mast [20 mg/g] 10 g masti

D06AX07 gentamicin

Doziranje: Mast se lagano namaže na inficirano područje 3-4 puta na dan i, po potrebi, pokrije gazom.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GARAMYCIN - KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Rp mast [1 mg/g] 15 g masti

GENTAMICIN - BOSNALIJEK d.d.

Rp mast [1 mg/g] 15 g masti

GENTAMICIN - GALENIKA a.d.

Rp mast [1 mg/g] 15 g masti

D06AX09 mupirocin

Doziranje: Mast se u tankom sloju nanosi na oboljeli dio kože 2-3 puta na dan tokom 5-10 dana. Ovisno o indikaciji i mjestu infekcije mupirocin se primjenjuje bez zavoja, sa pokrovnim zavojem, a po potrebi i pod okluzijom. Treba izbjegavati primjenu na većim površinama.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BETRION - PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Rp mast [20 mg/g] 15 g

D06B Hemioterapeutici za lokalnu primjenu

D06BA Sulfonamidi

D06BA01 sulfadiazin-srebro

Doziranje: Krema se u tankom sloju nanosi na oboljela mjesta 2 puta na dan. Prije svakog ponovnog mazanja mora se mlazom vode ili antiseptičkim sredstvom odstraniti sloj ranije nanešene kreme i eksudata, koji je poslije upotrebe kreme obiman, po boji sličan gnoju, ali je najčešće sterilan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ARGEDIN - BOSNALIJEK d.d.

Rp krema [10 mg/g] 40 g kreme

Rp krema [10 mg/g] 50 g kreme

DERMAZIN - LEK farmacevtska društva d.d.

Rp krema [10 mg/g] 250 g kreme

Rp krema [10 mg/g] 50 g kreme

D06BB Antiviroci (antivirusni lijekovi)

D06BB03 aciklovir

Doziranje: U početnoj fazi, kad bolesnik osjeća samo bol i svrab, treba odmah započeti terapiju. Oboljela područja mažu se 5 puta na dan, svaka 4 sata.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ACIKLOVIR - JUGOREMEDIJA fabrika lekova a.d. Zrenjanin

Rp mast [50 mg/g] 5 g masti

ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D.

Rp krem [50 mg/g] 5 g kreme

HERNOVIR - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

Rp krem [50 mg/g] 10 g kreme

HERPLEX - BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Rp krema [50 mg/g] 5 g kreme

Rp krema [50 mg/g] 10 g kreme

VIROLEX - KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Rp krem [50 mg/g] 5 g kreme

D06BX Ostali hemioterapeutici za lokalnu primjenu**D06BX01 metronidazol**

Doziranje: Prije nanošenja kreme, kožu treba oprati. Krema se u tankom sloju nanosi na zahvaćena područja kože 2 puta na dan, ujutro i uveče, i blago utrlja. Liječenje se provodi do 9 sedmica. Kliničko poboljšanje može se očekivati unutar 3 sedmice tretmana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ROZAMET 1% krema - JADRAN - Galenski laboratorij d.d.

Rp krema [10 mg] 25 g kreme

D07 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI**D07A Kortikosteroidi, monokomponentni****D07AA Kortikosteroidi, slabog djelovanja (grupa I)****D07AA02 hidrokortizon**

Doziranje: 3 puta dnevno utrljati u oboljelo mjesto.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HYDROCORTISON - GALENIKA a.d.

Rp mast [25 mg/g] 5 g masti

D07AB Kortikosteroidi, srednje jakog djelovanja (grupa II)**D07AB02 hidrokortizon butirat**

Doziranje: Krem ili emulziju treba nanijeti 2 puta na dan na oboljelo mjesto i blago utrljati. Kod težih oblika oboljenja može se nanijeti i 4 puta dnevno, uz prethodno odobrenje ljekara. Kod male djece dovoljna je primjena lijeka jedanput na dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LOCIDON CRELO 0,1 g/100 g emulzija za kožu - ASTELLAS PHARMA EUROPE B. V.

Rp emulzija za kožu [0,1 g/100 g] 30 ml emulzije za kožu

LOCIDON LIPOCREMA 0,1 g/100 g krema - ASTELLAS PHARMA EUROPE B. V.

Rp krema [0,1 g/100 g] 30 g kreme

D07AB10 alklometazon

Doziranje: 2-3 puta na dan mazati oboljelo mjesto i blago utrljati.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AFLODERM - BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Rp krem [0,5 mg/g] 20 g kreme

Rp mast [0,5 mg/g] 20 g masti

D07AC Kortikosteroidi, jakog djelovanja (grupa III)**D07AC01 betametazon**

Doziranje: Krem ili mast dobro utrljati 2 puta na dan, ne duže od 3 nedjelje.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BELODERM - BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Rp krema [0,5 mg/g] 15 g kreme

Rp krema [0,5 mg/g] 30 g kreme

Rp mast [0,5 mg/g] 30 g masti

Rp mast [0,5 mg/g] 15 g masti

BETAZON - JADRAN - Galenski laboratorij d.d.

Rp krema [0,5 mg/g] 25 g kreme

Rp mast [0,5 mg/g] 25 g masti

BETHANAT - BOSNALIJEK d.d.

Rp mast [0,5 mg/g] 15 g masti

KUTERID - LEK farmacevtska družba d.d.

Rp krem [0,5 mg/g] 20 g kreme

Rp mast [0,5 mg/g] 20 g masti

D07AC03 dezoksimetazon

Doziranje: mast: Nanijeti na površinu 2 do 3 puta dnevno blagim mazanjem ili koristiti sa okluzivnim zavojem. Namijenjen je liječenju osjetljive i suve kože, kao i za oboljenja koja zahtijevaju liječenje masnim podlogama. ESPERSON krem i ESPERSON mite krem: Nanijeti tanak sloj na oboljelo mjesto 2 do 3 puta dnevno blagim mazanjem. Okluzivni zavoj nije potreban. Esperson krem se preporučuje za početak terapije isključivo kod odraslih. Esperson mite krem služi za nastavak terapije, a može se kratkotrajno primjeniti i u terapiji djece starije od godinu dana. Lijek se ne smije koristiti duže od 7 dana bez nadzora lekara.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ESPERSON - JUGOREMEDIJA fabrika lekova a.d. Zrenjanin

Rp krem [2,5 mg/g] 30 g krema

ESPERSON M - JUGOREMEDIJA fabrika lekova a.d. Zrenjanin

Rp mast [2,5 mg/g] 30 g masti

ESPERSON mite - JUGOREMEDIJA fabrika lekova a.d. Zrenjanin

Rp krem [0,5 mg/g] 30 g krema

D07AC04 fluocinolon acetonid

Doziranje: 2-3 puta mazati oboljelo mjesto i blago utrljati.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FLUACET - JADRAN - Galenski laboratorij d.d.

Rp gel [0,25 mg/g] 30 g gela

PANOLON - HEMOFARM A.D. Vršac

Rp krem [0,25 mg/g] 15 g krema

Rp mast [0,25 mg/g] 15 g masti

SINODERM - GALENIKA a.d.

Rp gel [0,25 mg/g] 30 g gela

Rp krem [0,25 mg/g] 15 g krema

Rp mast [0,25 mg/g] 15 g masti

D07AC13 mometazon

Doziranje: Lijek se na oboljeli dio nanosi jednom dnevno u tenkom sloju.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ELOCOM krema - SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG

Rp krema [1 mg/g] 15 g kreme

Rp krema [1 mg/g] 30 g kreme

ELOCOM losion - SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG

Rp losion [1 mg/g] 20 ml losiona

ELOCOM mast - SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG

Rp mast [1 mg/g] 15 g masti
Rp mast [1 mg/g] 30 g masti

D07AC14 metilprednizolon aceponat

Doziranje: Jednom dnevno namazati oboljelo mesto u tankom sloju. Terapija ne smije trajati duže od 12 nedjelja kod odraslih, odnosno duže od 4 nedjelje kod djece.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ADVANTAN - BAYER SCHERING PHARMA AG

Rp krem [1 mg/g] 15 g
Rp mast [1 mg/g] 15 g

D07AD Kortikosteroidi, vrlo jakog djelovanja (grupa IV)

D07AD01 klobetazol propionat

Doziranje: Krema ili mast nanose se u tankom sloju na oboljelo mjesto 1-2 puta na dan do pojave poboljšanja, kada upotrebu treba prekinuti. Tretman ne treba da traje duže od 4 sedmice uz adekvatnu kontrolu. Antiinflamatorni učinak lijeka može se pojačati upotrebom okluzivnog zavoja.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DERMOVATE - WELLCOME LIMITED

Rp krema [0,05 mg/100 g] 25 g kreme
Rp mast [0,05 mg/100 g] 25 g masti

D07B Kombinacije kortikosteroida i antiseptika

D07BB Kombinacije kortikosteroida srednje jakog djelovanja i antiseptika

D07BB01 flumetazon, salicilna kiselina

Doziranje: Mast se nanosi na oboljeli dio kože u tankom sloju i lagano utrljava jedan ili dvaput na dan. Može se koristiti i okluzijski zavoj. Tada se mast nanese na oboljeli dio kože, prekrije plastičnom folijom i učvrsti flasterom. Zavoj treba ostaviti do 12 sati. Liječenje hroničnih kožnih bolesti ne smije se naglo prekinuti jer može nastati egzacerbacija procesa.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LOCASALEN - PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Rp mast [(0,2 + 30,0) mg/g] 30 g masti

D07C Kortikosteroidi, kombinacije sa antibioticima

D07CA Kortikosteroidi slabog djelovanja, kombinacije sa antibioticima

D07CA01 hidrokortizon, oksitetraciklin

Doziranje: 2-4 puta na dan namazati oboljelo mjesto u tankom sloju.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GEOKORTON mast - PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Rp mast [(10 + 30) mg/g] 20 g masti

HYDROCYCLIN - GALENIKA a.d.

Rp mast [(10 mg + 30 mg)/g] 5 g masti

Rp mast [(10 mg + 30 mg)/g] 20 g

D07CB Kortikosteroidi srednje jakog djelovanja, kombinacije sa antibioticima

D07CB05 flumetazon, neomicin

Doziranje: 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju, tokom 3 nedjelje.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LOCACORTEN N mast - PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Rp mast [(0,2 + 5) mg/g] 15 g masti

LOCACORTEN N - PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Rp krem [(0,2 mg + 5 mg)/g] 15 g kreme

D07CC Kortikosteroidi jakog djelovanja, kombinacije sa antibioticima

D07CC01 betametazon, gentamicin

Doziranje: 2 puta na dan mazati oboljelo mjesto u tankom sloju.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BELOGENT - BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Rp krem [(0,5 + 1,0) mg/g] 15 g kreme

Rp krem [(0,5 + 1,0) mg/g] 30 g kreme

Rp mast [(0,5 + 1,0) mg/g] 15 g masti

Rp mast [(0,5 + 1,0) mg/g] 30 g masti

BETHAGEN - BOSNALIJEK d.d.

Rp krem [(0,5 + 1,0) mg/g] 15 g kreme

DIDERMAL - GALENIKA a.d.

Rp krem [(0,5 + 1,0) mg/g] 15 g krema

Rp mast [(0,5 + 1,0) mg/g] 15 g masti

DIPROGENTA krema - SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG

Rp krema [(0,5 + 1,0) mg/g] 15 g kreme

DIPROGENTA mast - SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG

Rp mast [(0,5 + 1,0) mg/g] 15 g masti

KUTERID G - LEK farmacevtska družba d.d.

Rp krem [(0,5 + 1,0) mg/g] 15 g kreme

Rp mast [(0,5 + 1,0) mg/g] 15 g masti

D07CC02 fluocinolon acetonid, neomicin

Doziranje: 2-3 puta dnevno naneti na obolelo mesto i blago utrljati.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SINODERM N - GALENIKA a.d.

Rp krem [(0,25 mg + 3300 i.j.)/g] 15 g kreme

Rp mast [(0,25 mg + 3300 i.j.)/g] 15 g masti

D07X Kortikosteroidi, ostale kombinacije**D07XC Kortikosteroidi jakog djelovanja, ostale kombinacije****D07XC01 betametazon, salicilna kiselina**

Doziranje: 2 puta na dan nanijeti mast ili losion na oboljelo mjesto i blago utrljati.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**BELOSALIC - BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.**

Rp mast [(0,5 + 30,0) mg/g] 30 g masti

Rp rastvor za kožu [(0,5 + 20,0) mg/g] 50 ml rastvora

BETHASAL - BOSNALIJEK d.d.

Rp losion [(0,5 + 20,0) mg/g] 50 ml losiona

Rp mast [(0,5 + 30,0) mg/g] 15 g masti

Rp mast [(0,5 + 30,0) mg/g] 30 g masti

KUTERID S - LEK farmacevtska družba d.d.

Rp dermalna otopina [(0,5 + 30,0) mg/g] 30 ml otopine

Rp mast [(0,5 + 30,0) mg/g] 30 g masti

D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI**D08A Antiseptici i dezinficijensi****D08AC Bigvanidi i amidini****D08AC02 hlorheksidin**

Doziranje: Dezinfekcija podnih površina: za čišćenje i dezinfekciju jako zaprljanih podnih površina koristi se nerazrijeđena 5 % otopina. Za svakodnevno čišćenje i dezinfekciju preporučuje se 0,5 % otopina koja se priprema na slijedeći način: 100 ml preparata + voda do 1000ml. Dezinfekcija predmeta i radnih površina: Za čišćenje i dezinfekciju jako zaprljanih predmeta i radnih površina koristi se nerazrijeđena 5 % otopina. Za svakodnevno čišćenje i dezinfekciju preporučuje se 0,5 % otopina koja se priprema na slijedeći način: 100 ml preparata + voda do 1000ml. Ovako pripremljena otopina se nanosi raspršivačem ili gazom (vatom) uz blago trljanje. Dezinfekcija ruku: za dezinfekciju ruku preporučuje se 0,5 % otopina koja se priprema na slijedeći način: 100 ml preparata + voda do 1000ml. Nakon pranja ruku standardnim sapunima, ruke pokvasiti toplom vodom. Oko 5 ml 5 % otopine, podijeliti u obje šake i blagim utrljavanjem nanositi u trajanju od 15 sekundi. Nakon toga, ruke dobro isprati vodom i posušiti. Procedura se može ponoviti uz dodatnih 15 sekundi utrljavanja preparata i ponovljeno ispiranje i posušivanje.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**HIBIBOS G - BOSNALIJEK d.d.**

BRp rastvor [5 g/100 ml] 1000 ml rastvora

BRp rastvor [5 g/100 ml] 5000 ml rastvora

HIBIBOS T - BOSNALIJEK d.d.

BRp rastvor [0,5 g/ 100 ml] 1000 ml rastvora

BRp rastvor [0,5 g/100 ml] 500 ml rastvora

BRp rastvor [0,5 g/100 ml] 5000 ml rastvora

HIBIBOS K - BOSNALIJEK d.d.

BRp otopina [5,0 g/100 ml] 1000 ml

BRp otopina [5,0 g/100 ml] 5000 ml

D08AG Preparati sa jodom

D08AG02 povidon jod

Doziranje:

- rastvor za kožu: premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog;
- mast: 3 puta na dan aplikovati na oboljelo mjesto, a može se prekriti zavojem;
- Ljekovita pjena se primjenjuje prema uputstvu proizvođača.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BETADINE - ALKALOID AD

- BRp mast [100 mg (odgovara 10 mg aktivnog joda)/g] 20 g
BRp otopina [100 mg (odgovara 10 mg aktivnog joda)/g] 100 ml otopine
BRp rastvor za kožu [10 g (odgovara 1g aktivnog joda)/100 ml] 1000 ml
BRp rastvor za kožu [7,5 g (odgovara 0,75 g aktivnog joda)/100 ml] 1000 ml

IZOSEPT D - BOSNALIJEK d.d.

- BRp rastvor za kožu [10 g (odgovara 1 g aktivnog joda)/100 ml] 100 ml
BRp rastvor za kožu [10 g (odgovara 1 g aktivnog joda)/100 ml] 1000 ml
BRp rastvor za kožu [10 g (odgovara 1g aktivnog joda)/100 ml] 500 ml

IZOSEPT P - BOSNALIJEK d.d.

- BRp rastvor za kožu [7,5 g (odgovara 0,75 g aktivnog joda)/100 ml] 100 ml
BRp rastvor za kožu [7,5 g (odgovara 0,75 g aktivnog joda)/100 ml] 500 ml
BRp rastvor za kožu [7,5 g (odgovara 0,75 g aktivnog joda)/100 ml] 1000 ml

POVIDON JOD - HEMOFARM A.D. Vršac

- BRp ljekovita pjena [7,5 g (odgovara 0,75 g aktivnog joda)/100 ml] 5000 ml
BRp ljekovita pjena [7,5 g (odgovara 0,75 g aktivnog joda)/100 ml] 500 ml
BRp rastvor za kožu [10 g (odgovara 1 g aktivnog joda)/100 ml] 100 ml
BRp rastvor za kožu [10 g (odgovara 1 g aktivnog joda)/100 ml] 5000 ml
BRp rastvor za kožu [10 g (odgovara 1 g aktivnog joda)/100 ml] 500 ml

D08AJ Kvarterna amonijum jedinjenja

D08AJ57 oktenidindihidrohlorid, 2-fenoksietanol

Doziranje: Željeno područje dezinfekcije temeljito se navlaži otopinom i ostavi djelovati tokom 1 minute. Za tretman genitalnog područja preporučuje se nanošenje otopine raspršivačem ili tuferom. Za tretman upalnih procesa u usnoj šupljini oko 20 ml otopine se intenzivno grglja tokom 20 sekundi i dodatno zadrži u ustima tokom jedne minute. Nakon toga otopinu treba ispljunuti.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OCTENISEPT otopina - SCHULKE & MAYER GmbH

- BRp otopina [(0,1 + 2,0) g/100 g] 50 ml
BRp otopina [(0,1 + 2,0) g/100 g] 250 ml
BRp otopina [(0,1 + 2,0) g/100 g] 1000 ml

D09 LJEKOVITI ZAVOJI

D09A Ljekoviti zavoji

D09AA Ljekoviti zavoji sa masnom podlogom i antiinfektivima

D09AA02 fusidinska kiselina

Doziranje: Gaza se nanosi direktno na ranu i mijenja svaki drugi dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

STANICID - HEMOFARM A.D. Vršac

Rp impregnirana kompresna [30 mg] 10 impregniranih kompresa

D10 PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMJENU

D10A Lijekovi protiv akni za lokalnu primjenu

D10AF Antiinfektivni protiv akni za lokalnu primjenu

D10AF01 klindamicin

Doziranje: 2 x na dan nanosi se tanki sloj otopine na kožu. Smanjenje upalnih lezija postaje vidljivo za 2-4 nedjelje, a maksimalno smanjenje postiže se nakon 12 nedjelja.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AKNET - JADRAN - Galenski laboratorij d.d.

Rp otopina za kožu [1 g/100 ml] 30 ml otopine

DALACIN T - PFIZER LUKSEMBURG SARL

Rp otopina za lokalnu primjenu [1 g/100 ml] 30 ml otopine

D10AX Ostali lijekovi protiv akni za lokalnu primjenu

D10AX03 azelatna kiselina

Doziranje: 2 puta na dan mazati oboljelo mjesto na koži (kod osjetljive kože primijeniti u prvoj nedjelji jedanput dnevno)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SKINOREN - BAYER SCHERING PHARMA AG

Rp krema [0,2 g/g] 30 g kreme

D11 OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI

D11A Ostali dermatološki preparati

D11AX Ostali dermatološki preparati

D11AX aluminijum-acetotartarat, tečni ekstrakt kamilice

Doziranje: Kod blagih kožnih upala nanosi se više puta na dan u tankom sloju na oboljelo mjesto. Za liječenje edema, uganuća i hematoma gel se nanosi u debelom sloju na oboljelo mjesto koje se zatim zavije.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

KAMAGEL - KRKA, tovarna zdravil, d.d.

BRp gel [(0,05 + 0,01) g/g] 40 g

D11AX01 minoksidil

Doziranje: Odrasli-ujutro i uveče priloženim dozatorom nanijeti po 1 ml losiona na suhu čelavu površinu, te blago utrljavati od središta ka krajevima. Doza ne smije biti veća od 2 mL. Trajanje terapije zavisi od rezultata. Nakon što se postigne kliničko poboljšanje, doza se smanjuje na dozu održavanja koja iznosi 1 mL losiona 1-2 puta nedjeljno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PILFUD losion 2% - BOSNALIJEK d.d.

BRp rastvor za kožu [20 mg/ml] 60 ml rastvora za kožu

PILFUD losion 5% - BOSNALIJEK d.d.

BRp losion [50 mg/ml] 60 ml losiona

D11AX15 pimekrolim

Doziranje: Tanak sloj pimekrolimusa u vidu 1% krema nanijeti na oboljelu kožu dva puta dnevno. Krem se mora blago, ali potpuno, utrljati u kožu. Može se aplikovati na sva područja kože, uključujući vrat, glavu, lice i intertiginozna područja. U dugotrajnoj terapiji atopijskog dermatitisa, primjenjuje se poslije pojave prvih znakova i simptoma bolesti, da bi se spriječilo njeno napredovanje.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ELIDEL - NOVARTIS PHARMA AG

Rp krema [10 mg] 15 g